

Nőgyógyászati fertőzések fajtái, tünetei és kezelése

1. Herpes genitalis: a herpes simplex vírus által okozott szexuális úton terjedő fertőzés, mely az első fertőzés esetén szeméremtesti fájdalmat, oedemat, a szeméremtesten hólyagokat okoz, melyek felszakadását követően fájdalmas fekélyek keletkeznek, a lágyéki nyirokcsomók fájdalmas duzzanatával.

2. Bartholin-mirigy tályog: a nagyajkak alsó harmadában, a hüvelybemenet egyik oldalán bakteriális fertőzés következtében kialakuló fájdalmas, diónyi vagy szilványi képlet, mely tapintásra igen érzékeny. A tályog kialakulását megelőzheti a Bartholin-mirigy cystája, fájdalomtalan duzzanata.

3. Gombás hüvelyfertőzés: a hüvely NEM szexuális úton terjedő fertőzése. Hirtelen kezdődő szeméremtestre lokalizálódó égő érzés, viszketés, irritáció jellemzi, mely csapadékos fehér hüvelyváladékkal társul. A kellemetlen panaszokat nem szabad figyelmen kívül hagyni, mielőbb szakorvoshoz kell fordulni.

4. Krónikus visszatérő gombás hüvelyfertőzés: abban az esetben beszélünk erről, ha egy év alatt legalább 4 akut sarjadzógomba fertőzés alakul ki.

5. Bakteriális vaginosis: a hüvely NEM szexuális úton terjedő fertőzése. Homogén, fehér, kellemetlen szagú hüvelyváladékozás a jellemzője, melyet nem kísér a gombás hüvelyfertőzésre jellemző egyéb szubjektív tünet. Amennyiben ezen tünetek mindegyikét, vagy akár néhány jellemzőjét tapasztalja magán, nem érdemes várni, mert szövődményként akár meddőség is kialakulhat.

6. Trichomonas vaginitis: Szexuális úton terjedő hüvelyfertőzés. Jellemzője a kellemetlen szagú, sárgás- zöldes, habos váladékozás, fájdalmas vizelés, szeméremtesti irritáció.

7. Méhnyak gyulladás: Szexuális úton terjedő bakteriális fertőzés (Chlamydia, Neisseria, Ureaplasma, Mycoplasma) következményeként jön létre. Gyakran tünetmentes marad a beteg. Előfordulhat bővebb hüvelyváladék, vizelési panasz, esetleg szexuális együttlét utáni vérzés.